

峨嵋山之藥用植物

周 太 炎

中國科學院植物分類研究所

作者於抗日期中，任教於重慶歌樂山國立藥學專科學校，曾於一九三八年夏季派赴峨嵋山區調查藥用植物，歷時數月，採得標本共計六一七號，其中可供藥用者有二〇七種及數變種。其中各藥物之土名，藥用部份，調服方法，效用等，均根據山中俚醫及世業草藥者之口述而一一詳加記錄。其中多數種類雖未見於我國醫藥書籍之內，但悉為當地人民所習用者。今依恩格勒（Engler）氏之分科系統，每種分別記述其土名、學名、採集號數、藥用部份、調服方法、及效用等，以供國內醫藥界之參考及藥物化學工作者之分析研究，而廣其應用。

此次標本之採集，得徐國鈞先生之襄助，蕨類植物標本由秦仁昌先生鑑定，繖形科植物標本由單人驊博士鑑定，其他高等植物大部份標本由裴鑑博士鑑定，特此深致謝忱！所採全部標本，今保存於南京華東藥學專科學校，部份標本保存於中國科學院植物分類研究所華東工作站標本室內。

本稿原已刊載於前國立中央研究院植物學彙報第一卷第四期，二九八至三〇八頁（一九四七年），當時因限於彙報性質，關於其土名及效用等，故用英文發表，然其意義尚有不甚明確之處，茲為普及起見，復用中文寫出。

石 松 科（Lycopodiaceae）

伸筋草（*Lycopodium clavatum* Linn.）：五六號，生於岩石上。全草煎水或浸酒服，可治筋骨痛。

海 金 沙 科（Schizaceae）

鐵線草，一名海金沙（*Lygodium japonicum* Sw.）：四二號，攀緣於山坡岩石間。全部煎水服，通利大小便。

苔 蘚 科（Hymenophyllaceae）

水蓮（*Trichomanes naseanum* Christ.）：一三七號，生於懸坡溝旁樹上。根莖搗爛調麵粉，敷治水火燙傷。

水龍骨科 (Polypodiaceae)

樹林珠 (*Asplenium prolongatum* Hook.): 一四三號, 生於山溝樹幹上。全植物煎水服, 能治百病, 俚醫視為神藥。

石林珠 (*Asplenium trichomanes* Linn.): 三九七號, 生於岩石上。全部打麵浸酒服, 治跌打傷及腰痛。

山枝草 (*Coniogramme intermedia* Hieron. var. *glabra* Ching): 二五七號, 生於山坡。根莖用作傷藥, 煮水服, 治跌打傷。

石連蕨 (*Drynaria propinqua* (Wall.) J. Sm. var. *mesosoria* Christ.): 五八〇號, 生於岩石上, 將根莖先浸酒數星期, 然後每日服用藥酒, 可以療傷。

一皮草 (*Lepisorus contortus* (Christ.) Ching): 四一五號, 生於樹林中樹枝上。全植物先浸酒半月, 將藥酒傾出, 服治跌打損傷。

星鱗一皮草 (*Lepisorus macrosphaerus* (Baker) Ching var. *asterolepis* (Baker) Ching): 三八八號, 生於老樹已腐爛之樹皮上。服法及效用同上。

觀音蓮 (*Microsorium Hancockii* (Baker.) Ching): 一三九號, 生於樹上。全部打爛調麵, 粉敷治刀口傷。

岩腎子 (*Nephrolepis cordifolia* Presl): 五七二號, 生於岩石上。此植物根旁所生之塊莖, 煮肉同服, 有助腎臟治疝氣之效能。

一枝劍 (*Phymatodes hastata* (Thbg.) Ching): 六一號, 生於陰濕岩石上。根莖及葉片煎水服, 可治跌打傷。

山枝草 (*Phymatodes Stracheyi* Ching): 四八九號, 生於樹林中樹枝上。全部浸酒服, 用作打藥。

觀音蓮 (*Polypodium amoenum* Wall. var. *chinense* (Christ.) Ching): 四一三號, 生於老樹樹枝上。根莖浸酒服, 治跌打損傷。

萬年青 (*Polystichum omeiense* C. Chr.): 一五八號, 二六九號, 生於陰濕山坡。全植物煎水服, 用作發表劑, 可減低胃內溫度。

豬毛草 (*Pteris actinopteroides* Christ.): 一六號, 生於岩隙間。全部煎水服下, 有消痰清胃之效。

反背紅 (*Pyrrohsia lingua* (Thbg.) Farwell): 六二號, 生長在樹幹上。全植物用作打藥, 煎水服。

石岩金 (*Pyrrohsia mollis* (Kze.) Ching): 五八二號, 生於岩石上。全部搗爛, 和以麵粉, 敷治刀口傷。

紫杉科 (Taxaceae)

羅漢松 (*Podocarpus macrophylla* D. Don.): 二一四號, 生於山坡上。種子煎水服, 有補肺助腎之效能。

莎草科 (Cyperaceae)

三稜草 (*Cyperus rotundus* Linn.): 一三六號, 沿山溝邊生長。全草煎水服, 止咳化痰。

天南星科 (Araceae)

鐵蒲草 (*Acorus gramineus* Soland.): 二八六號, 生於山谷中溪旁。根莖浸酒服, 治跌打傷。

麻芋 (*Arisaema consanguineum* Schott.): 二三號, 生於山坡上陰地。球莖磨爛, 調以口液, 擦治瘡癢。

天南星 (*Arisaema dilatatum* Buchet.): 三二七號, 生於山坡。球莖乾後, 磨成粉末, 調以麵粉與水分, 蒸製成餅, 食之鎮咳化痰。

爛屁股 (*Arisaema lobatum* Engl.): 三三五號, 生於草坡上。球莖有毒, 不可入口, 磨爛搽治瘡毒, 並可作成藥箭射鳥。

半夏 (*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.): 六八號, 山坡田野草叢中均有之。球莖打爛, 調以麵粉, 用水煎服, 有止咳化痰之效。

鴨跖草科 (Commelinaceae)

竹葉花 (*Polia japonica* Thunb.): 一九四號, 生於山溝旁。將根搗爛, 浸酒半月後飲之, 治跌打傷。

燈心草科 (Juncaceae)

筆上花 (*Juncus bulbosus* Linn.): 三九四號, 生於岩石上。全草煎水服, 治頭痛。

百合科 (Liliaceae)

韭菜 (*Allium odorum* Linn.): 一一九號, 自生於山野。全植物搗爛後, 敷治蟲毒; 葉供食用。

天門冬 (*Asparagus filicinus* Ham.): 一六九號, 纏繞於樹幹上。將塊根切成小塊, 煮肉服之, 有補虛健身之效。

千朵蓮 (*Asparagus filicinus* Ham. var. *brevifolia* Baker.): 二二號, 纏繞於灌木上。塊根煮肉服, 治虛弱咳嗽等症。

石竹子 (*Disporopsis fusco-picta* Hance): 五二號, 生於山坡上陰處。根及根莖用作補藥, 煮肉服之。

土茯苓 (*Heterosmilax japonica* Kunth.): 二五號, 攀緣於山林中灌木上。將塊根切成薄片, 煎水服, 消痰發汗。

大魚鱗花, 一名玉簪 (*Hosta Sieboldiana* Engl.): 四八號, 寺院內栽植於陰濕地。根打爛後, 敷治瘡毒; 花與豬蹄同煮, 佐食可治頭痛。

老雅花 (*Lilium australe* Stapf.): 二六號, 生於山坡雜草間。鱗莖煮食, 作為補藥; 鱗莖研爛, 可敷治開水燙傷。

喇叭 (*Lilium cathayanum* Wils.): 一七〇號, 生於高山草叢中。根及葉煎水服, 可以發汗退熱。

豬葉菜 (*Oligobotrya Henryi* Oliv.): 二一九號, 生於高山平坡。全植物煎水服, 可以清火。

六月花 (*Ophiopogon Bockianus* Diels): 一七二號, 生於岩石旁。全部煎水服, 可以清汗發表。

竹葉連 (*Ophiopogon clavatus* Wright.): 四〇六號, 生於岩坡上。根用作打藥, 浸酒服。

韭菜黃 (*Ophiopogon Wallichianus* (Kth.) Hook. f.): 四一六號, 生於岩石上。全草打爛, 敷治傷口或皮膚發炎處。

重樓 (*Paris chinensis* Fr.): 二〇號, 生於山坡雜草間。用酒醋將根莖磨成漿汁, 擦治頭癬。

鐵燈台 (*Paris quadrifolia* Linn.): 三五九號, 生態與上種同。將根莖打爛取汁, 擦治瘡毒。

樹彫 (*Polygonatum anomalum* Hua): 五一號, 生於老樹樹幹上。根莖搗爛, 製成膏藥, 貼治各種瘡毒, 但醫云極效。

佛頂珠, 一名吉祥草 (*Reineckia carnea* Kunth): 一一四號, 生於山坡陰濕處。全草浸酒半月後, 服治跌打損傷。

九牛草 (*Rhodea Fangii* Wang et Tang): 四〇九號, 生於山坡半照地帶。其用法及功用與上述一種相同。

九節連 (*Rhodea japonica* Roth.): 一四二號, 生於陰濕山坡。根莖及根莖豬蹄服, 或打爛敷, 可治九子癰瘡。

洋屈花 (*Smilax riparis* DC. var. *angusta* Wang et Tang): 一一一號, 生於叢林中。全植物煎水服, 有清火清熱之效用。

六月霜 (*Tofieldia iridacea* Fr.): 一五二號, 生於草坡上。全部切為小段, 與棗子煎水服, 治婦女白帶症。

山黃瓜 (*Tricyrtis pilosa* Wall.): 一一七號及三一四號, 生於平坡上。根煎水服, 可治跌打傷。嫩葉食用, 味如黃瓜, 故有山黃瓜之名。

人頭髮, 一名蒜薹蘆 (*Veratrum album* Linn.): 四三九號, 生於峨山金頂高坡。根煎水服, 可治瘧疾, 為山中要藥之一; 浸酒服, 可療傷。

小魚鱗花 (*Ypsilandra thibetica* Fr.): 九七號, 生於潮濕山坡。全草煎水服之, 有清火之效。

石 蒜 科 (*Amaryllidaceae*)

黃老雅蒜 (*Lycoris aurea* Herb.): 五八六(乙)號, 生於岩坡上。鱗莖搗爛, 敷治水火燙傷。

紅老鴉蒜 (*Lycoris radiata* Herb.): 五八六(甲)號, 生態同上種。其用法及效用, 亦同上種。

鳶 尾 科 (*Iridaceae*)

扁竹葉 (*Iris japonica* Thunb.): 一七六號, 生於山溝旁。根莖磨爛敷, 或煎水服, 治跌打損傷。

薑 荷 科 (Zingiberaceae)

九薑連 (*Alpinia japonica* Miq.): 四四號, 生於山谷中。將根莖切成薄片, 浸酒十日後, 搽治無名腫毒。

蘭 科 (Orchidaceae)

白芨 (*Bletilla striata* (Teunb.) Reichb. f.): 二四號, 生於草坡上。塊莖煮肉或煎水服, 可以止吐血, 並有止咳化痰補肺之功效。

岩鐵板 (*Calanthe lancifolia* Hg.): 二五八號, 生於懸岩上庇陰處。根及根莖用作打藥, 浸酒服。

趨水花, 一名石斛 (*Dendrobium nobile* Lindl.): 六一〇號, 生於陰濕岩石上或樹幹上。將莖切成小段, 煎水或泡入開水中, 服後可以增進口液之分泌, 並有降低胃溫之功能。

山燭花 (*Epipactis Mairei* Schl.): 五二三號, 生於陰濕山坡上。全部搗爛, 敷治水火燙傷。

銀線盆 (*Goodyera Schlenchtendaliana* Reichb. f.) 一一〇號, 生於岩隙間。全草浸酒服, 治跌打諸傷, 甚效。

竹青槐 (*Habenaria ciliolaria* Kränzl.): 五九九號, 生於陰濕山坡上。全部浸燒酒半月後, 服治跌打損傷。

記書兒 (*Liparis plicata* Fr. et Sav.): 二六五號, 生於懸岩上。全植物煮肉服, 止咳並可消喉炎。

竹葉青 (*Listera grandiflora* Rolfe): 三四七號, 生於陰坡上。全部煎水服, 用作清涼劑。

腎子草 (*Malaxis muscifera* (Ldl.) O. Ktze. var. *stelostachya* Tang et Wang): 四三三號, 生於山坡陰濕處。用根煮肉服, 補腎。

九子連 (*Nephalophyllum Chowii* Tang et Wang): 一四四號及五四九號, 生態同上。根莖煮豬蹄服, 有發散瘡毒之效; 或將根莖打爛, 敷治九子瘡。

石球花 (*Pholidota yunnanensis* Rolfe): 五八四號, 生於岩石上。全部煮肉服, 可止咳喘嘔吐等症。

無土名 (*Platanthera japonica* (Thunb.) Lindl.): 四二二號, 生於樹枝上。全植物用作傷藥, 有促進血液循環之效能, 煎水服用。

三 白 草 科 (Saururaceae)

側耳根 (*Houttuynia cordata* Thunb.): 三二四號, 沿水溝邊生長。全草打爛, 敷治脫臼。葉供食用。

胡 椒 科 (Piperaceae)

岩筋草 (*Peperomia reflexa* A. Diet.): 五七五號, 匍伏生於岩石上。全部浸酒十日後, 服藥酒可治跌打損傷。

金粟蘭科 (Chloranthaceae)

嫩頭子 (*Chloranthus glaber* (Th.) Makino): 一八七號, 生於叢林下。葉煎水服, 可止嘔吐。

桑 科 (Moraceae)

牛奶子 (*Ficus heteromorpha* Hemsl.): 二二六號, 生於山坡上。葉煎水服, 可以清涼。

冰粉子 (*Ficus Martinii* Levl.): 五七〇號, 生於叢林中。果實磨碎爲涼粉, 可供食用。

蕁 麻 科 (Urticaceae)

冬裏麻 (*Debregeasia edulis* (S. et Z.) Wedd.): 五六七號, 生於岩石上。果及葉煎水服, 用作發表劑。

仙馬桿 (*Elatostema ficoides* (Wall.) Wedd.): 二八四號, 生於山谷中溝旁。莖葉煮食, 可解暑熱。

糯米菜 (*Memorialis hirta* (Blume) Wedd.): 一二二號, 平臥生於田野。根搗爛, 敷治刀鎗傷。

馬兜鈴科 (Aristolochiaceae)

細辛 (*Asarum himalaicum* Hook. f. & T.): 一一八號, 生於樹林下岩隙間。根煎水服, 清汗發表。

蛇 菰 科 (Balanophoraceae)

谷花 (*Balania involucrata* (Hook f.) v. Tiegh.): 一二七號, 生於山林中已腐之樹根上。全部曬乾後磨碎, 和以麵粉及甜酒, 蒸做糕餅食之, 可治內外痔瘡。

蓼 科 (Polygonaceae)

野來蕎 (*Fagopyrum esculentum* Muench): 二七八號, 生於草坡上。全部水煮, 喂治小豬吐白水症及瘟病。

何首烏 (*Polygonum multiflorum* Thunb.): 五六三號, 纏繞生於樹幹上。塊根煮肉服, 用作補藥。

莧 科 (Amarantaceae)

白牛吃膝, 紅牛吃膝 (*Achyranthes bidentata* Bl.): 一〇六號及一三三號, 生於草坡上。根煎水服, 或磨成粉末, 和以米粉、糖、油調食, 有滋補效能。

紫茉莉科 (Nyctaginaceae)

胭脂花 (*Mirabilis Jalapa* Linn.): 五六一號, 生於山坡上。莖葉煮肉服, 治虛弱症。

商陸科 (Phytolaccaceae)

水雞服, 一名商陸 (*Phytolacca acinosa* Roxb.): 一八〇號, 生於岩坡上。將根煮肉服, 有消腫毒之效。

石竹科 (Caryophyllaceae)

金沙草 (*Cerastium vulgatum* Linn.): 四四四號, 生於岩坡上。全草煎水服, 治小兒驚風。

催筋草 (*Cucubalus baccifer* Linn.): 四五四號, 生於路旁。全草泡於開水中片刻, 洗治小兒驚風。

筋骨菜 (*Stellaria saxatilis* Buch. et Ham.): 一二三號, 生於田野。全草煎水, 洗治筋骨腫痛。

毛茛科 (Ranunculaceae)

峨嵋花, 即烏頭 (*Aconitum chinense* Paxton.): 六一六號, 栽培於山坡上。塊根煎水服, 可治風濕症及神經痛; 亦可泡酒擦治全身麻痺及諸傷。

血烏 (*Aconitum Hemsleyanum* E. Pritz.): 三二三號, 生於山中水溝旁。將根磨調唾涎, 搽治癰瘡; 打爛敷於箭頭上, 可以射鳥。

鐵藤烏 (*Aconitum racemulosum* Fr.): 四九三號, 生於草坡上。全草打爛後, 調以麵粉及桐油, 敷治癰瘡。

鐵破繭 (*Beesia calthaeifolia* (Max.) Balf. et W. W. Sm.): 三六〇號, 生於路旁。全部煎水服, 治跌打傷。

木通 (*Clematis Armandi* Fr.): 四九號, 纏繞於樹枝上。莖用作通氣瀉藥, 切斷, 浸酒經旬後服之。

威靈仙 (*Clematis chinensis* Osbeck.): 一〇二號, 生於山坡上雜木間。全部浸酒服, 治跌打傷。

小木通 (*Clematis Gouriana* Roxb.): 二四五號, 纏繞於灌木上。全部煎水服, 利尿。

野黃連, 一名鳳尾連 (*Coptis chinensis* Fr.): 一六四號, 生於岩石上庇陰處。根莖煎水服, 清火, 並可治眼炎。山中尚有栽培者, 惟以野生者為貴。

赤芍 (*Paeonia albiflora* Pall.): 三六六號, 栽培於寺院旁。根煎水服, 為婦女通經藥及補藥。

木通科 (Lardizabalaceae)

八月藤 (*Akebia trifoliata* Koids. var. *australis* (Diels) Rehd.): 五四〇號, 攀緣於灌木上。將莖切成小段, 泡酒數星期後服之, 治跌打傷並能活血通氣。

放光藤 (*Sargentodoxa cuneata* Rehd. et Wils.): 五七九號, 纏繞生長於樹上。葉搗爛敷治瘡毒; 莖切成小段, 浸酒服, 有促進血液循環之效能。

小藥科 (Berberidaceae)

藤刺黃 (*Berberis Sargentiana* Schneid.): 三四五號, 生於岩石上。全部煮水服, 用作清涼劑。

淫羊藿 (*Epimedium acuminatum* Fr.): 一一二號, 生於岩石上。全部煎水服之, 清火壯陽。

紅毛漆 (*Leontice robusta* (Maxim.) Diels): 三三〇號, 生於絕壁上。浸根於酒中, 經半月後服之, 治跌打傷及五癆七傷等症。

刺黃柏 (*Mahonia ganpinensis* Schneid.): 一七三(乙)號, 生於叢林中。全部磨成粉末, 散治黃水瘡; 煎水服, 治蟲牙火牙等症。

刺黃柏 (*Mahonia gracilipes* (Oliv.) Fedd.): 一七三(甲)號, 生態同上。用法及功用亦同上。

八角蓮 (*Podophyllum versipelle* Hance): 一八號及三五六號, 生於岩坡上。將根莖磨碎, 調以口液, 敷治梅毒。

木蘭科 (Magnoliaceae)

大血藤 (*Kadsura chinensis* Hance): 一五四號, 攀緣生於懸崖上。莖浸酒服, 治筋骨痛, 通氣活血, 甚效。

白葉大血藤 (*Kadsura polysperma* Yang): 二九二號, 生於山坡。果實研碎後, 浸酒服之, 可治全身腫痛。

厚朴 (*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils.): 六三號, 栽植於寺院內。樹皮煎水或用開水泡服, 可以健胃。

小血藤 (*Schizandra propinqua* var. *sinensis* Oliv.): 三四號, 生於叢林中。將莖切成小段, 浸酒經月, 服治筋骨痛, 與大血藤同用更佳。

樟科 (Lauraceae)

香桂 (*Cinnamomum Wilsonii* Gamble): 一五六號, 生於懸坡溝旁。樹皮用作香料, 有開胃及消飲食飽脹之效能。

石楠楠 (*Lindera Sutchuenensis* Gamble): 四一號, 生於叢林中。將根搗爛, 調以水分及麵粉, 敷治瘡毒。

虎耳草科 (Saxifragaceae)

牛尾子 (*Astilbe rubra* Hook. f. et Thom.): 二九〇號及三〇五號, 生於山坡草叢中。根煎水服, 有清汗發表之效。

岩白菜 (*Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl.): 二二二號, 生於絕壁上。全部煮肉或煎水和糖服, 治頭暈虛弱等症, 並謂治癆之要藥。

黃常山，一名番南 (*Dichroa febrifuga* Lour.): 七七號，生於山坡上。根煎水服，治瘡疾甚效。

仙桃盤 (*Hydrangea xanthoneura* Diels): 四五五號，生於平坡上。樹皮炒乾後，磨成粉末，調油敷治刀口傷。

水五龍 (*Rodgersia aesculifolia* Batol): 四九二號，生於山坡上。根搗爛，敷治瘡毒。

虎耳草 (*Saxifraga sarmentosa* Linn.): 二〇五號，生於陰濕岩石上。全草打爛，敷治手腕上生奇癢惡癢。

杜仲科 (Eucommiaceae)

杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliv.): 五八八號，生於伏虎寺旁。樹皮用作健壯藥，水煎或浸酒服。

薔薇科 (Rosaceae)

鬼劍頭，一名龍芽草 (*Agrimonia Eupatoria* Linn.): 八六號，生於路旁。根煎水服，可治瘡疾。

水連沙 (*Cotoneaster horizontalis* Decne.): 四五一號，生於岩坡上。葉煎水服，止咳。

草五加，一名蛇莓 (*Duchesnea indica* (Andr.) Focke.): 二四三號，生於路旁。果實生食或將全草打爛，敷治皮膚瘡癢。

藍布枕，一名水楊梅 (*Geum japonicum* Thunb.): 三九號，生於濕地。全草煮肉服，可治咳嗽及吐血。

山石榴 (*Rosa omeiensis* Rolfe.): 四三七號，生於懸坡上。果實煎水或浸酒服，治痢疾有效。

脆沙草 (*Spiraea myrtilloides* Rehd.): 四二九號，生於山坡上雜樹間。果實研成粉末，用作刀傷藥。

豆科 (Leguminosae)

青胡豆 (*Desmodium fallax* Schindl.): 五九七號，生於草坡上。全部煎水服，有清汗發表之效能。

詹草子 (*Desmodium racemosum* (Thunb.) DC.): 九八號，生於草坡上。全部浸酒服，可促進呼吸作用。

紅掌草 (*Desmodium sequax* Wall.): 二三五號，生於叢林間。花枝煎水服，有清汗發表之效用。

比子草 (*Desmodium szechuenense* Schindl.): 五一八號，生於叢林間。全部打爛，調以麵粉及水分，蒸製成餅，服治瘡疾。

田葛藤 (*Pueraria Thunbergii* Benth.): 七四號，匍伏生長於山坡上。根煎水服之，清汗發表。

酢漿草科 (Oxalidaceae)

地海椒 (*Oxalis Griffithii* Edgw. et Hook f.): 一三八號, 生於岩石上。全植物煎水, 洗治眼睛腫痛。

芸香科 (Rutaceae)

臭沙子 (*Boenninghausenia albiflora* Reichb.): 八三號, 生於草坡上。根及葉用作治瘡藥, 病人發冷煎將根煎水服, 或將研爛之葉塞入鼻孔內, 男左女右。

苦木科 (Simarubaceae)

苦皮子, 一名苦木 (*Picrasma quassioides* Benn.): 三七六號, 生於山溝旁。樹皮煎水, 洗治家畜虱子。

漆樹科 (Anacardiaceae)

五倍子 (*Rhus semialata* Murr. var. *Osbeckii* DC.): 九五號, 生於斜坡叢林間。蟲瘿有收斂性, 可供藥用, 搗爛調以麵粉, 敷治毒蟲咬傷。

富眼背 (*Rhus sinica* Diels): 一九七號, 生於山谷中。蟲瘿打爛, 敷治癩痢瘡。

冬青科 (Aquifoliaceae)

山黃楊 (*Ilex yunnanensis* Fr.): 四一七號, 生於岩坡上。葉泡入開水中, 飲之清火。

鼠李科 (Rhamnaceae)

木子花 (*Rhamnus Esquirolii* Lévl.) 一八六號, 生於叢林中。葉及果實打爛, 敷治刀口傷。

綉錦藤 (*Sageretia Henryi* Drum. et Spr.): 六〇一號, 生於日照岩坡上。果實煎水服, 有清火及清胃熱之效。

葡萄科 (Vitaceae)

過山龍 (*Ampelopsis aconitifolia* Bge.): 三二號, 匍伏生長於山坡上。根皮搗爛, 敷治腫毒各瘡。

蛇蜈巴 (*Tetrastigma obtectum* Pl.): 五〇號, 攀緣於大樹上。全部搗爛, 敷治蛇咬傷口。

山茶科 (Theaceae)

細炒米子 (*Eurya Fangii* Rehd.): 三九八號, 生於平坡上。葉煎水服, 可清胃熱。

峨茶 (*Camellia sinensis* (L.) O. Ktze.): 五七三號, 生於山坡上。葉作茶用。

金絲桃科 (Guttiferae)

奶漿草 (*Hypericum erectum* Thunb.): 二號, 生於山坡上。葉及花枝煮肉服, 產婦有發奶之效。

急奶草 (*Hypericum Sampsoni* Hance): 一二八號, 生於山坡上。全部煮肉服, 可以激發產婦之奶。

旌節花科 (Stachyuraceae)

通草 (*Stachyurus himalaicus* Hook. f. et Thoms.): 五一號, 生於山坡上叢林間。莖中之髓, 浸酒服, 可以通氣。

野牡丹科 (Melastomaceae)

花筒梗 (*Osbeckia crinita* Clark.) 五九三號, 生於山坡上。根煎水服, 有開胃之效能。

柳葉菜科 (Onagraceae)

紅紗草 (*Circaea alpina* Linn.) 四八二號, 生於岩坡上。全草浸酒十日以上, 服治跌打傷。

山麻條 (*Epilobium angustifolium* Linn.): 三二八號, 生於山坡上。種子上之白毛, 用作刀傷止血藥。

柳葉菜 (*Epilobium indicum* Haussk.): 四二八號, 生於岩坡上。藥用同上。

五加科 (Araliaceae)

刺藤烏 (*Acanthopanax trifoliatum* (L.) Schneid.): 五九五號, 生於山坡上。葉、花、果實均供藥用, 水煎為健胃劑, 酒浸為打藥。

刺龍袍, 一名樛木 (*Aralia chinensis* Linn.): 七八號, 生於田野。根煎水服, 可消胃腸氣; 根打爛, 敷治刀口傷。

三角楓, 一名牛皮楓 (*Hedera nepalensis* Koch. var. *sinensis* Rehd.): 七二號及五三一號, 攀緣於樹幹上。莖葉煎水, 洗治各種風毒。

樹五加 (*Nothopanax Davidii* Hemsl.): 九一號, 生於岩坡上。全部浸燒酒服, 治跌打損傷。

太子皮, 一名假通脫 (*Schefflera Delavayi* (Fr.) Harms.): 九四號, 生於陰濕山坡上。根皮煎水為打藥, 葉煎水為發表劑。

繖形科 (Umbelliferae)

峨參 (*Anthriscus sylvestris* Hoffm.): 三四九號, 栽於陰濕山坡雜草中。根浸洗米水內數日, 然後煮肉服之, 為虛弱補藥。

葉子花 (*Dickinsia hydrocotylodes* Fr.): 四七七號, 生於平坡上。全草煎水, 溫治頭痛。

高山地胡椒 (*Hydrocotyle nepalensis* Hook.): 一八二號, 生於路旁。全部打爛, 敷治狗咬傷口。

山芹菜 (*Ligusticum dauroides* Fr.): 四六二號, 生於岩坡上。根煎水服, 用作發表劑。

秦莨 (*Ligusticum sinense* Oliv.): 五四四號, 生於岩坡上。根浸酒半月後, 服之通經。

× 當歸 (*Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim.): 二九五號, 栽培於農圃內。根煎水或煮肉服, 爲通經活血補虛之婦科藥。

鵝脚板 (*Pimpinella diversifolia* DC.): 一號, 生於草坡上。全草搗爛, 敷手腕脈上, 可治癰疾。

水芹菜 (*Pternopetalum botrychioides* (Dunn) H.-M.): 一八五號, 五四三號, 沿水溝旁生長。全草打爛, 敷治刀口傷。

水中生 (*Pternopetalum leptophyllum* (Dunn) H.-M.): 三七〇號, 生於溪水中。全部煎水服, 清汗發表。

亮火蟲 (*Pternopetalum trichomanifolium* (Fr.) H.-M.): 二六六號, 沿山溝旁生長。全部打爛, 敷治刀口傷。

肺筋草 (*Sanicula lamelligera* Hance.): 九號, 生於草坡上。全部浸酒, 服之活血。

四 照 花 科 (Cornaceae)

天脚板 (*Aucuba chinensis* Benth.): 一七七號, 生於山坡上。果實打爛, 調以麵粉, 敷治跌打傷。

藥上花 (*Helwingia chinensis* Batal.): 一九五號, 生態同上。葉煎水服, 清火。

紫 金 牛 科 (Myrsinaceae)

開喉箭, 一名八爪金 (*Ardisia hortorum* Maxim.): 一二號及二一號, 生於山坡上雜林下。根煎水服, 可以消喉炎或喉痛; 根浸酒服, 能治跌打傷。

山胡椒 (*Maesa hupehensis* Rehd.): 一六七號, 生於山坡上。全部搗碎, 調以麵粉, 敷治胸氣痛。

報 春 花 科 (Primulaceae)

紅頭索 (*Lysimachia Liui* Chien): 二七二號, 生於山坡上。全草打爛, 敷治刀口傷。

四塊瓦 (*Lysimachia paridiformis* Fr.): 二二〇號, 生於路旁。葉及花煎水服, 治胃腸氣, 並能發汗。

木 犀 科 (Oleaceae)

水泡蟲蚤 (*Ligustrum purpurescens* Yang): 八八號, 生於叢林間。全部煎水服, 用作發表劑。

馬 錢 科 (Loganiaceae)

高山雞扇草 (*Buddleia albiflora* Hemsl.): 一二五號, 生於懸岩上。全部煎水服, 可以化痰止咳。

龍胆科 (Gentianaceae)

翠藍花 (*Gentiana chinensis* Kusn.): 四四八號, 生於山坡上。花揉爛後, 敷治狗咬傷口。

山瓢兒草 (*Swertia punicea* Hemsl.): 二二九號, 生於草坡上。全草煮肉服, 可治耳聾症。

旋花科 (Convolvulaceae)

鈎耳藤, 一名牽牛花 (*Calystegia hederacea* Wall.): 五八號, 蔓生於草坡上。種子浸水服, 有利尿作用。

馬鞭草科 (Verbenaceae)

矮桐子 (*Clerodendron Bungei* Steudel.): 一三號, 生於陰坡。根浸酒一星期後, 服治跌打傷; 根同烏雞煮服, 可治頭暈。

海州常山, 亦名矮桐子 (*Clerodendron trichotomum* Thunb.): 九〇號, 生於陰坡。根煎水服, 可治瘰癧。

唇形科 (Labiatae)

夏枯草 (*Prunella asiatica* Nakai): 一八九號, 生於田野。花序煎水或泡入開水中。用作發表劑及清涼劑。

咳嗽草 (*Elsholtzia calycocarpa* Diels): 四四七號, 生於草坡上。全草煎水服, 清汗發表。

四輪香 (*Hanceola sinensis* (Hemsl.) Kudo): 三〇四號及四六七號, 生於樹林下。效用同上。

薄荷 (*Mentha arvensis* Linn.): 三五號, 生於路旁。莖葉煎水, 清涼發散。

野大麻 (*Microtoena Delavayi* Prain): 三四三號, 生於草坡上。全部煎水, 洗治風濕痛。

紅結香 (*Paraphlomis rugosa* (Benth.) Prain): 一四八號, 生於岩石上。莖葉煎水服, 清汗發表。

紫蘇 (*Perilla frutescens* (L.) Brit. var. *crispa* (Th.) Decne. f. *nankinensis* (Lour.) Sun): 五九號, 生於路旁。莖葉及種子用作發散劑, 煎水服之。

草藤烏 (*Plectranthus macranthus* Hook. f.): 四一四號, 生於草叢中。全部打爛, 敷治瘡毒。

破雞子 (*Salvia Cavaleriei* Lévl. var. *simplicifolia* Stib.): 一〇五號, 生於溪旁。全部煮肉服, 鎮咳。

四香花 (*Scutellaria quadrilobulata* Sun): 四六五號, 生於路旁。全草煎水服, 用作發表藥, 有退熱之效。

山萵香 (*Teucrium viscidum* Bl.): 二二七號, 生於草坡上。全植物煎水服, 有清血解毒之效。

玄參科 (Scrophulariaceae)

天黃 (*Scrophularia Oldhami* Oliv.): 二九四號, 田間栽培。根煎水服, 治頭暈虛弱症。

苦苣苔科 (Gesneriaceae)

大一面綠 (*Didissandra sesquifolia* C. B. Cl.): 一一五號, 生於陰濕懸岩上。用根浸酒服, 止咳嗽痰。

十藤南 (*Lysionotus pauciflorus* Maxim.): 五四號, 生於岩坡上。全部切成小片, 浸酒半月後, 服治腰痛。

爵床科 (Acanthaceae)

瓦子草, 一名爵林 (*Justicia procumbens* Linn.): 二三八號, 生於陰坡上。莖葉煎水服, 治腰痛。

透骨草科 (Phrymaceae)

老婆子針線 (*Phryma leptostachya* Linn.): 六號, 生於草坡上。全部搗爛, 加豬油及花椒粉末調和, 搽治瘡毒。

茜草科 (Rubiaceae)

胖兒草 (*Anotis urophylla* Wall.): 三一三號, 生於路旁。全草打爛, 敷治瘡毒。

雞屎藤 (*Paederia foetida* Linn.): 七〇號, 纏繞於灌木上。全藤及葉加紅棗與糖同水煎服, 爲婦女補藥。

忍冬科 (Caprifoliaceae)

山銀花 (*Lonicera fuchsioides* Hemsl.): 四〇一號, 纏繞於樹上。全部煎水服, 治小兒痘瘡。

臭草 (*Sambucus Hookeri* Rehd.): 三一號, 生於路旁庇陰處。根煎水服, 消治腫病; 莖葉泡入開水中, 洗治風濕痛。

敗醬科 (Valerianaceae)

山油菜 (*Triplostegia glandulifera* Wall.): 二八二號, 五一四號, 生於草坡上。全部煎水, 洗治風濕麻痛; 葉泡入開水中, 飲之清火。

山蘿蔔科 (Dipsacaceae)

續斷 (*Dipsacus aspera* Wall.): 八五號, 生於山坡樹林下。根煎水服, 止瀉血症。

葫蘆科 (Cucurbitaceae)

瓜粉 (*Thladiantha nudiflora* Hemsl.): 一三一號, 生於田野。根爲刀口傷藥。

雙邊子, 一名瓜蓋 (*Trichosanthes multiloba* Miq.): 一三〇號, 生於田野。種子煎水服, 消痰止咳。

桔梗科 (Campanulaceae)

泡參 (*Adenophora capillaris* Hemsl.): 八〇號及二九八號, 生於草坡上。根煎水或煮肉服, 爲虛弱大補藥。

雞眼睛 (*Campanumaea axillaris* Oliv.): 一九六號, 生於岩坡上。全部煎水服, 止嘔吐; 根煮肉服, 補腎。

黨參 (*Codonopsis tangshen* Merr.): 二九號, 生於山坡叢林下。根煎水或煮肉服, 治虛弱症及補胃。

飽雞婆草 (*Pratia begonifolia* (Wall.) Lindl.): 二三九號, 匍伏於山坡上。全草煎水服, 清汗發表。

菊科 (Compositae)

白花菜 (*Adenocaulon bicolor* Hook.): 二八〇號, 生於山坡。葉煮食之清火。

兔兒風 (*Ainsliaea glabra* Hemsl.): 二〇〇號, 生於岩坡上。全部打爛泡水或浸酒, 治跌打傷。

走馬丹 (*Ainsliaea rubrinervis* Chang): 一五〇號, 生於絕壁險岩上。用法及效用同上, 據僱醫云極效。

煙頭草, 一名天明精 (*Carpesium abrotanoides* Linn.): 二二四號, 生於路旁。全草打爛, 敷治狗咬傷口。